

شماره: ۶۵۸/۷۳۸۹۴
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
پیوست: ندارد



معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی - اشتباه در تزریق داروی با هشدار بالا - لزوم رعایت اصول تزریق داروهای با هشدار بالا - معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سلام؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع، گزارشی مبنی بر وقوع عوارض جدی متعاقب اشتباه در تزریق داروی هشدار بالای (High Alert) سولفات منیزیم از یکی از مراکز درمانی کشور، به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار خانم ۶۵ ساله مبتلا به کانسر گوارشی بوده که به علت هیپومنیزیمی تحت درمان با داروی سولفات منیزیم ۵۰ درصد با دوز ۲ سی سی داخل سرم یک لیتری قرار گرفته است. پرستار مربوطه، تازه کار و نا آشنا با اصول تزریق داروهای با هشدار بالا بوده و بدون توجه به دستور دارویی پزشک معالج اقدام به انفوزیون وریدی کل ویال سولفات منیزیم نموده که در حین انفوزیون وریدی داروی مذکور، بیمار دچار برادیکاردی شدید شده که خوشبختانه با انجام اقدامات درمانی لازم در اسرع وقت بهبودی حاصل شده است.

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی مشابه شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- اجرای دستورالعمل تزریق داروهای با هشدار بالا شامل چک مستقل دوگانه دو نفر از کادر حرفه ای پرستاری به منظور اجرای دقیق دستور داروهای با هشدار بالا بر بالین بیمار
- ۲- آموزش های مکرر، مداوم و کافی و لازم پرستاران محترم در خصوص رعایت دستورالعمل های مرتبط با ایمنی بیماران از جمله دستورالعمل تزریق داروهای با هشدار بالا به خصوص پرستاران تازه کار شاغل در مراکز درمانی خواهشمند است، دستور فرمائید، مراتب به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت محترم اطلاع رسانی شود.

دکتر نوشین محمدحسینی
مدیر کل دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت محور

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۹ شماره: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir