

نگهداری دارو در منزل



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی چهارم
تعاونت غذا و دارو دفتر تحقیق و توسعه
تلفن ناماس: ۳۳۴۵، ۳۵



از مصرف داروهای زیر پرهیز کنید:

* باقیمانده محلول سرم، قطروه و شربت هایی را که به طور ناقص مصرف شده اند.

* محلول دارویی که غلیظ شده، تغییررنگ داده یا بو و طعم آن تغییر کرده است.

* کپسول و قرصی را که ترک خورده، نرم شده، بهم چسبیده یا تغییر رنگ داده است.

* پماد و کرمی که ترک خورده، سفت شده یا نشست کرده است.

* قرص آسپرین که بوی سرکه گرفته است.

* شربت آنتی بیوتیک پودری که درب آن باز شده یا آب جوش سرد شده تهیه گردیده و بیش از ۲ هفته در یخچال یا ۷ روز در دمای اتاق نگهداری شده است.

- در مسافت داروی فود را در چمدان قرار نداهه و همراه فود داشته باشید چرا که امکان کم شدن چمدان یا قرار گرفتن آن در ممیط های فلیپ سود یا فلیپ کار و محدود دارد.

- پنهان فشرده مومود در قوطی را دور بیندازید چرا که طوبت را به داخل قوطی جذب فواهد کرد.

- از مصرف خودسرانه یا تمیز دارو برای دیگران پرهیز نماید. برای استفاده از داروهای مومود در منزل هزارا با پاکش فود یا مسلول فنی داروهات(دارو سار) مشورت کنید.



اطلاعات عمومی درباره مصرف داروها:

- هنتر الاماکن دارو را در منزل نگهداری نکنید.

- دارو را در ۱۰ روز از دسترس اطفال قرار نهاده.

- دارو را در ادشیشه یا قوطی اصلی فود نگاه دارید.

- دارو را در برابر نور و مرارت قرار نهاده.

- هرگز داروهای فله ای و بدون برمسب (دارمزل) یا معلم کار نگهداری نکنید.

- عالالت انتصاری EXP Date شان ممنه تاریخ انقضای دارو من باشد، در زمان فرید و مصرف دارو به تاریخ انقضای آن توجه نمایید.

- حداقل هر ۳ ماه یک بار داروهای مومود در منزل را از نظر تاریخ مصرف بررسی کنید و داروهای تاریخ گذشته را دور ببریزید و این که داروی دور ریفته نشده فارغ از دسترس کودکان باشد اطمینان حاصل کنید.

کمتر خانواده ای است که در منزل خود قفسه ای پر از انواع واقسم قرصها و شربتها را که در یخچال یا در جبهه کمک های اولیه نگهداری می کنند. نداشته باشد متاسفانه یکی از مشکلات عدیده نظام دارو و درمان در کشور ما مصرف بی رویه و زیاد دارو است و از طریق دیگر بعضی از افراد بروحت سعادت به درمان با داروی کم اعتمادی ندارند و اکثر آنها کسی را می بسندند که داروی بیشتری تجویز کنند... ازقرار معلوم منتظر از نگهداری داروها در منزل این است که روزی از آنها استفاده شود، استفاده مجدد از این داروها علاوه بر اینکه اغلب خودسرانه و بدون تجویز برشک خواهد بود... ممکن است در موادی غیر منطقی بوده و یا خطر مصرف داروهای فاسد و تاریخ گذشته را به همه را داشته باشد. همچنین امکان مصرف این داروها توسط کودکان یا فراداری که اختلالات روحی دارند وجود دارد. لذا به نظریه رسید ضررها نگهداری دارو در منزل در بسیاری از موارد بیشتر از فایده آن است. بنابراین توصیه می شود هنگام بروز بیماری و نیاز به مصرف دارو توسط هر یک از افراد خانواده، بیمار توسط برشک معالج معاينه شده و داروی تجویز شده همان موقع از داروخانه خریداری شود و دوره درمان و مصرف دارو به صورت کامل انجام پذیرد.

- قرصها یا کپسولها را در همام یا مکان های نمناک منزل نگهداری نکنید.
- از بین ۱۰ روز از دسترس اطفال قرار نهاده.
- داروهای را در یه پهلو نگهداری نکنید، مگر بعضی داروهای خاص که در برمسب آن قید شده باشد.
- داروهای را برای مدت طولانی در آئوپیل قرار نهاده.
- اگر برای یادآوری زمان مصرف دارو ترمیم می دهد که داروها را در معرض دید فود قرار دهدید بهتر است این یادآوری با ظرف یا قوطی خالی یا یک یادداشت انجام شود و ظرف اصلی ممتوی دارو در معلم امن و دور از دسترس کودکان گذاشته شود.
- پس از مصرف دارو از ممکن بسته شدن درب آن اطمینان حاصل کنید زیرا ممکن است باعث رفته شدن یا نشست دارو و یا تسربیع در فساد آن شود.